

# PARACETAMOL


Analgésico 1º escalón

**DOSIS MÁXIMA: 4 gramos / día**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Escasos** efectos adversos. Puede asociarse con AINES.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA

# DICLOFENAC

Analgésico 1º escalón



**DOSIS MÁXIMA: 150 mg / día**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Digestivos:** Gastritis erosiva, ulceraciones gastroduodenales, hemorragias.


**Renales:** Insuficiencia renal aguda, retención hidrosalina, edemas.

**Hemostasia:** Hemorragias por disminución de la agregación plaquetaria.

**Hipersensibilidad:** Broncoespasmo, rash cutáneo.

**Audición:** Acúfenos, hipoacusia.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# IBUPROFENO

Analgésico 1º escalón

**DOSIS MÁXIMA: 2-3 gr / día**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Digestivos:** Gastritis erosiva, ulceraciones gastroduodenales, hemorragias.


**Renales:** Insuficiencia renal aguda, retención hidrosalina, edemas.

**Hemostasia:** Hemorragias por disminución de la agregación plaquetaria.

**Hipersensibilidad:** Broncoespasmo, rash cutáneo.

**Audición:** Acúfenos, hipoacusia.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# KETEROLAC

Analgésico 1º escalón

**DOSIS MÁXIMA: 90-120 mg / día**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Digestivos:** Gastritis erosiva, ulceraciones gastroduodenales, hemorragias.


**Renales:** Insuficiencia renal aguda, retención hidrosalina, edemas.

**Hemostasia:** Hemorragias por disminución de la agregación plaquetaria.

**Hipersensibilidad:** Broncoespasmo, rash cutáneo.

**Audición:** Acúfenos, hipoacusia.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# TRAMADOL

Analgésico 2° escalón

**DOSIS MÁXIMA: 400 mg / día**

**EXCRECIÓN: Renal**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# MORFINA

Analgésico 3° escalón

**DOSIS MÁXIMA: No tiene**

**EXCRECIÓN: Renal**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

**ATENCIÓN:** Comprimidos de liberación prolongada, no deben triturarse. Tragarlos con un sorbo de agua y no masticarlos.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# METADONA

Analgésico 3° escalón

**DOSIS MÁXIMA: No tiene**  
**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# BUPRENORFINA

Analgésico 3° escalón

**DOSIS MÁXIMA: No tiene**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# CODEINA

Analgésico 2° escalón

**DOSIS MÁXIMA: 240-360 mg / día**

**EXCRECIÓN: Renal**

**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# FENTANILO

Analgésico 3° escalón.

**DOSIS MÁXIMA: No tiene**  
**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Si utiliza parches de fentanilo, tenga presente que el mismo debe cambiarse cada 3 días. Anote la fecha en el parche para controlar el momento de cambiarlo. Varíe el lugar de colocación.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO**  
**PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# DEXAMETASONA

Analgésico 3° escalón.

**DOSIS MÁXIMA: No tiene**  
**EFFECTOS ADVERSOS:**

**Iniciales:** Vómitos, somnolencia, disforia, confusión.

**Ocasionales:** Sequedad de boca, transpiración, retención urinaria, prurito, mioclonías.

**Continuos:** Constipación.

Si se debe realizar descenso de dosis, consulte con su médico ya que en ocasiones es necesario un descenso gradual y NO debe suspenderse abruptamente.

Esta información es de carácter breve y general.  
**Consulte con su médico** por inquietudes particulares



**INSTITUTO**  
**PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA