


**MORFINA Y SUS  
DERIVADOS:**

**EFFECTOS  
SECUNDARIOS**



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA



# **¡AVISO!**

**Los analgésicos opioides  
pueden generar efectos  
adversos, pero CASI  
TODOS desaparecen en  
los primeros días.**

**NO suspendas la medicación. Hablá con tu  
médico sobre los efectos adversos**

**Al inicio (sólo los primeros días de tratamiento)**

# **Náuseas y Vómitos**

## **¿Qué hacer?**

**Dieta fraccionada en cantidades pequeñas**

**Beber agua en la medida de lo posible**

## **¿Qué tomar?**

**Verifique si ya tiene un medicamento para las náuseas.**

**Consulte. Su médico evaluará el tratamiento para este síntoma**

**Al inicio (sólo los primeros días de tratamiento)**

# **Somnolencia**

**¿Qué hacer?**

**Corregir el estreñimiento**

**Beber agua en la medida de lo posible**

**¿Qué tomar?**

**Su médico valorará si necesita ajustar la dosis de medicación o un tratamiento para este síntoma**

**Siempre (durante todo el tiempo que tome opiáceos)**

# Constipación

**¿Qué hacer?**

**Corregir el estreñimiento**

**Responder rápidamente al deseo de ir al baño**

**¿Qué tomar?**

**Se recomienda el uso de laxantes**

**Siempre (durante todo el tiempo que tome opiáceos)**

# **Boca seca**

## **¿Qué hacer?**

**Limpieza bucal tras la comida**


**Enjuagues de manzanilla con limón**

**Masticar frutas ácidas y frías**

**Usar salivas artificiales**


## **¿Qué tomar?**

**No hace falta tomar ningún medicamento**



**En caso de  
persistencia o  
empeoramiento  
de estos  
síntomas,  
consulte con su  
equipo médico**

**Fuente: Seguridad del paciente en  
Cuidados Paliativos. Uso seguro de  
medicamentos en el domicilio. Junta de  
Extremadura**



**INSTITUTO  
PALLIUM**  
LATINOAMÉRICA  
MEDICINA PALIATIVA